



**Skyddsutrustning**  
Använd CE-märkta (eller motsvarande) nitrilgummihandskar (minsta tjocklek 0,40 mm) och ögonskydd

**Resistens**  
Använd inte produkten i områden där resistens mot klotianidin misstänks eller har fastställts. För att undvika resistens kan följande metoder användas:

- ett integrerat bekämpningsprogram såsom kombination av kemiska och mekaniska metoder och god hygien, med hänsyn tagen till lokala förhållanden (klimatförhållanden, målorganismer, användningsvillkor osv.).
- Följ alltid användningsinstruktioner avseende applicering och dosering.
- Alternera med produkter som innehåller aktiva substanser med ett annat verknings sätt.
- Regelbundna kontroller av effektiviteten bör genomföras för att säkerställa att resistens inte uppstår och för att undvika risker för nya agrep.

Om bevis på resistens finns så ska alla åtgärder sättas in för att utrota den behandlade populationen.

**Bortskaffande:**  
Häll inte ut oanvänd produkt på marken, i vattendrag, i rör (handfat, toaletter osv.) eller i avloppet. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare. Överblivet bete kan avlägsnas med svamp eller våt trasa med en 5% natriumkloridlösning. Rengöringsmaterial (svamp, trasa osv.) ska placeras i torskopporna. Hårdnat bete kan avlägsnas med spatel och ska placeras i torskopporna.

**Lagring**  
Förvaras oåtkomligt för barn. Skyddas från frost. Skyddas från solljus. Hållbarhet: upp till 24 månader.

**Norsk**

**Bruksområde: Innendørs**  
Et insekticid i gelform som er bruksklar til bekjempelse av kakerlakker og skjeggkre både i nymfestadiet og voksne. For bruk i:

- Boliger/husholdninger

• Lokaler for håndtering og lagring av næringsmidler  
• Offentlige bygninger  
• Bygninger for dyrehold, f.eks. dyrehager, dyrebutikker, veterinærmottak, laboratorier osv. (bare bygninger, forhåndsbehandlingsrom og lagerrom. Ikke i stall, båser, bur osv. der dyrene befinner seg)

**Bruksmengde:**  
Påfør Maxforce® Platin som små dråper på egnede steder. Gelen kan legges ut i hjørner, sprekker og hulrom. Bruksmengden tilpasses størrelsen på angrepet.  
Én dråpe = 0,1 g (ca. 7 mm diameter); 0,007 g (3 mm); 0,002 g (2 mm).  
Et tynt bånd som tilsvarer 1 dråpe, kan alternativt påføres  
Skal ikke påføres mer enn én gang per måned.

**Mot kakerlakker:**

Kakerlakksart	Mengden tilpasses størrelsen på angrepet per m <sup>2</sup>		
	Låg	Hög	Optimal effekt
Liten f.eks. Tysk kakerlakk	1 dråpe x 0,1 g	2 dråper x 0,1 g	Gelen skal ligge i minst 14 dager.
Stor f.eks. Orientalsk	2 dråper x 0,1 g	2 dråper x 0,1 g	Gelen skal ligge i minst 4 uker.
Amerikansk kakerlakk	2 dråper x 0,1 g	3 dråper x 0,1 g	Gelen skal ligge i minst 12 uker

Etter en måned kan nytt, ferskt åte påføres på nytt dersom kakerlakkene fortsatt er synlige.

**Mot skjeggkre:**  
20 små dråper (ca. 3 mm i diameter) eller 65 små dråper (ca. 2 mm i diameter) per kvadratmeter tilsvarer 0,1 g – 0,2 g/m<sup>2</sup>  
Gelen skal ligge i minst 8 uker for å oppnå optimal effekt. Hvis skjeggkre fortsatt er synlige etter den tiden, kan ny gel påføres.  
Påfør flere små dråper i områdene der sølvkre bor og gjemmer seg. Dette kan være områder som under/bak lister/terskler, panel eller andre områder som gir dekke.

Effekt av bekjempelsen kan ventes svært raskt, og døde insekter kan ses innen 24 timer etter påbegynt behandling. Maksimal effekt oppnås mellom 6 dager og 2 måneder etter påbegynt bekjempelse avhengig av størrelsen på angrepet, så lenge gelen blir liggende. Ved store angrep skal påføringspunktene inspiseres regelmessig (én gang i måneden), og mer gel påføres ved behov.

**Bruksanvisning**  
Maxforce® Platin påføres med en egnet gelapplikator.  
Etter behandlingen skal den tomme patronen kasseres på forsvarlig måte. Hvis patronen bare er delvis brukt, skal den fjernes fra applikatoren, forsegles med det medfølgende lokket og deretter oppbevares i henhold til anvisningene.  
Doseringspatroner må ikke åpnes eller forsøkes etterfylt.

Før behandling skal området undersøkes med egnet metode for å identifisere hvor angrep forekommer, f.eks. ved å bruke feller og/eller aerosoler for å jage ut skadedyrene, lete etter søl, avskallet hud, eggeskall osv.

For å oppnå optimal effekt, skal alle andre matkilder for kakerlakker (avfall, matrester osv.) fjernes fra det angrepne området for å oppmuntre til inntak av gelen.  
Produktet er særlig anvendelig i områder der konvensjonelle insekticider ikke kan brukes, f.eks. i nærheten av elektriske eller elektroniske apparater.

På steder der det er påvist spredning av kakerlakker, anbefales det å utvide påføringen av produktet også til omkringliggende områder for å forbedre bekjempelsen og unngå ytterligere spredning.  
Unngå svært støvete, fuktige og skitne overflater.  
Påfør ikke produktet på overflater som våtvaskes.  
Påføres ikke direkte på overflater der næringsmidler eller dyrefôr oppbevares, håndteres eller spises.  
Påføres kun på steder som er utilgjengelige for barn og dyr.  
Påfør ikke produktet i områder som nylig har vært behandlet med annet insekticid, og unngå å kontaminere gelen med andre insekticider.  
Unngå kontinuerlig bruk av produktet.  
Produktet skal ikke brukes i staller, dyreinnhegninger eller bur. Anbefales ikke i bygninger der det finnes insektspisende fugler og reptiler.  
Fjerning av gammelt produkt/gel skal gjøres av godkjente skadedyrbekjempere.  
Bruk egnede vernehansker ved håndtering av produktet.  
Unngå kontakt med huden.  
Vask hender og utsatt hud før du spiser og etter bruk.

**LES ANVISNINGENE NØYE FØR BRUK**  
**INFORMER GODKJENNINGSINNEHAVER OM EFFEKTEN UTEBLIR**  
**SKAL IKKE PÅFØRES PÅ ABSORBERENDE OVERFLATER**  
**ÅTET SKAL IKKE UTSETTES FOR SOLLYS ELLER VARMEKILDER**  
**BESKYTT MOT REGN**

**Informasjon:** Produktet kan sette dråper på enkelte følsomme materialer, f.eks. tekstiler. Prøv eventuelt først på et lite sted der det ikke synes.

**Verneudstyr**  
Bruk egnede vernehansker ved håndtering av produktet. Bruk CE-merkede (eller tilsvarende) nitrilgummihansker (minimumstykkelse 0,40 mm) og beskyttelsesbriller.

**Resistens**  
Bruk ikke produktet på steder hvor der er resistens mot klotianidin hos insekter som skal bekjempes. For å unngå resistens kan følgende metoder brukes:

- Bruk integrerte bekjempelsesmetoder, f.eks. kombinasjoner av kjemiske og fysiske kontrollmetoder og god hygiene, og ta hensyn til lokale forhold (klimaforhold, målorganismer, bruksvilkår osv.).
- Følg alltid produktets bruksanvisning som finnes på etiketten, med hensyn til påføringshyppighet og dosering.
- Bruk vekselvis produkter som inneholder aktive stoffer med ulik virkemåte.
- Regelmessige kontroller av effektiviteten bør foretas for å sikre at resistens ikke oppstår, og for å unngå risiko for nye angrep. Hvis det finnes bevis for resistens, skal alle tiltak settes inn for å utrydde den behandlede populasjonen.

**Avfallshåndtering**  
Ubrukt produkt skal ikke helles ut på bakken, i vassdrag, i rør (håndvask, toalett osv.) eller i avløpet  
Innhold/holder leveres til godkjent avfallsmottak.

Fersk gel som er til overs, kan fjernes med svamp eller våt klut med 5 % natriumkloridløsning. Rengjøringsmateriale (svamp, klut osv.) skal kastes i restavfallet (tørt avfall).  
Gammel gel som har blitt hard, kan fjernes med spatel og skal kastes i restavfallet (tørt avfall).

**Oppbevaring**  
Beskyttes mot frost  
Beskyttes mot sollys.  
Holdbart opptil 24 måneder.



# Maxforce® PLATIN

INSEKTMIDDEL • INSEKTSMEDEL

**Må kun anvendes som insektmiddel til erhvervmässig bekæmpelse af tysk, orientalsk og amerikansk kakerlak (B. Germanica, B. Orientalis, P. Americana) og skægget sølvkræ (Ctenolepisma longicaudatum).  
Må kun anvendes indendørs.**

**Mot kackerlakker og silfverfiskar inomhus. All annan användning är otillåten. Endast för yrkesmässigt bruk.**

**Bruksklar insekticid i gelform for bruk mot kakerlakker og skjeggkre. Kun for godkjente skadedyrbekjempere.**

Preparattype: Gel.  
Insektmiddel BPR-reg. nr. 18-620. Aktivstoff og biocidholdigt produkt er godkendt efter biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012).  
Brugsanvisning: Se indlægsseddel.  
Beredningsform: Bruksfærdigt bete.  
Insektbekæmpingsmiddel Behørighedsklasse 2, Reg nr. 5557.  
Bruksanvisning: Se bipackesedeln.  
Formuleringsstype: Åte (klar til bruk).  
Authorisation number: NO-2020-0184  
Bruksanvisning: Se vedlegg.

4 x 30 g e



5 701363 857304

Bayer A/S  
Bayer AB c/o Bayer A/S  
Arne Jacobsens Allé 13  
2300 København - Danmark  
Tlf./Tel.: +45 45 23 50 00

NOR86757141C - ARTICLE 86785730  
www.environmentalscience.bayer.dk  
www.environmentalscience.bayer.se  
www.environmentalscience.bayer.no

Produktionsdato og batchnummer: påtrykt emballagen/se förpackning.  
Holdbart/hållbar til 2 år fra/från produktionsdato

Bayer





**Dansk**

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes som insektmiddel til erhvervsmæssig bekæmpelse af tysk, orientalsk og amerikansk kakerlak (B. Germanica, B. Orientalis, P. Americana) og skægget sølvkræ (Ctenolepisma longicaudatum). Må kun anvendes indendørs.

Må ikke anvendes i stalde, fjerkræhuse, væksthuse og lignende.

Må ikke anvendes på arealer der rengøres med vand.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må ikke tømmes i kloakafføb.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Levnedsmidler og foderstoffer må ikke forurenes.

Hylder, borde og andre flader, hvor levnedsmidler skal ligge eller opbevares, må ikke behandles og skal efter arbejdet omhyggeligt renses for eventuelle stænk og spild.

**Dosering:**

Maxforce® Platin påføres som dråber eller tynde strenge.

En dråbe = 0,1 g (ca. 7 mm i diameter);  
0,007 g (3 mm); 0,002 g (2 mm).

**Mod kakerlakker:**

Påføres i de områder hvor kakerlakkerne opholder sig. Placeres i hjørner, revner, sprækker og hulrum. Mængde tilpasses kakerlakarten og angrebets omfang.

Kakerlakart	Dosis afhængig af angrebets omfang pr. m²	
	Lav	Høj
Små arter som tysk kakerlak	1 dråbe x 0,1 g	2 dråber x 0,1 g
Store arter som orientalsk og amerikansk kakerlak	2 dråber x 0,1 g	3 dråber x 0,1 g

Alternativt lægges samme mængde ud som en tynd streng.

For at være effektiv skal gelen virke:

- i mindst 14 dage for små kakerlakker
- i mindst 4 uger for orientalsk kakerlak

- i mindst 12 uger for amerikansk kakerlak for at opnå optimal effekt. Hvis kakerlakker stadig er synlige efter en måned, kan frisk gel påføres.

**Mod skægget sølvkræ:**

Dosis: 0,1 g - 0,2 g pr. m²

Påfør flere små dråber i områder, hvor sølvkræ lever og gemmer sig, f.eks. under karme, lister, paneler osv.:

- 20 små dråber (ca. 3 mm) eller
- 65 små dråber (ca. 2 mm).

Gelen skal forblive aktiv i mindst 8 uger for at opnå optimal effekt. Hvis sølvkræ stadig er synlige, kan frisk gel påføres.

Effekten kan forventes inden for 24 timer efter behandlingsstart. Maksimal effekt opnås efter 6 dage og op til 2 måneder efter bekæmpelsen er påbegyndt, afhængigt af angrebets størrelse, og så længe gelen forbliver aktiv.

Ved store angreb inspiceres påføringspunkterne regelmæssigt (en gang om måneden) og mere gel appliceres om nødvendigt.

Påfør ikke mere end en gang om måneden.

**Brugsanvisning**

Maxforce® Platin påføres med en speciel "udlægningspistol".

Efter behandlingen kasseres den tomme patron på en sikker måde. Er patronen delvist tømt kan den tages ud af pistolen og forsegles med den medfølgende hætte.

Patronen må ikke åbnes eller genfyldes.

Fjern alle fødekilder (affald, madrester osv.) før behandlingen påbegyndes for at tilskynde, at kakerlakkerne indtager gelen.

Må ikke anvendes på arealer og overflader, der rengøres ved brug af vand.

Undgå anvendelse på overdrevent støvede, fugtige eller fedtede overflader.

**Værnemidler**

Brug CE-mærkede nitrilgummihandsker (min. 0,4 mm) og beskyttelsesbriller.

**Resistens**

Anvend ikke produktet i områder, hvor der er mistanke om eller er konstateret resistens overfor clothianidin.

For at undgå resistens anbefales:

- at anvende integreret bekæmpelse såsom kombinationer af kemiske og fysiske metoder og god hygiejne under hensyntagen til lokale forhold (klimatiske forhold, målorganismer, brugsbetingelser osv.).
- at altid følge brugsanvisningen og angivet dosering.
- at anvende produkter med forskellige virkemekanismer.

- at undgå kontinuerlig anvendelse af samme produkt.
- at anvende Maxforce® Platin i et integreret bekæmpningsprogram.
- at regelmæssigt kontrollere om produktet er effektivt for at opdatere resistens, eller om der sker nye angreb.

I tilfælde af resistens, bør der gøres alt for at udrydde populationen.

**Bortskaffelse**

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

**Opbevaring:**

Opbevares utilgængeligt for børn.

Beskyttes mod frost.

**Svenska**

**Målorganismer:** Mot kackerlackor: tysk, orientalsk och amerikansk kackerlacka (B. Germanica, B. Orientalis, P. Americana).

Mot silverfiskar: Långsprötad Silverfisk (Ctenolepisma longicaudatum).

Endast för inomhusbruk.

En insekticid i gelform som är brukstydig för bekämpning av kackerlackor och silverfisk

både i nyfstadie och vuxna. För användning i:

- Bostäder/hushåll
- Lokaler för livsmedelshandling och lagring
- Offentliga byggnader
- Byggnader för djurhållning, ex. zoo, djuraffärer, kennlar, veterinärinrättningar, laboratorier etc. (endast byggnad, foderhantering och förvaringsutrymmen. Inte i stall, boxar, burar etc. där djuren befinner sig).

**Appliceringsdos:**

Applicera Maxforce® Platin i droppar eller tunna strängar på ytor i identifierade målområden. Kan placeras i hörn, sprickor, springor och hålrum.

Appliceringsdosen anpassas efter angreppets omfattning.

En droppe = 0,1 g (ca 7 mm i diameter); 0,007 g (3 mm); 0,002 g (2 mm).

En tunn sträng motsvarande en droppe kan alternativt appliceras.

**Mot kackerlackor:**

Kackerlackarter	Appliceringsdos för given angreppsgrad per m²	
	Låg	Hög
Liten t.ex. tysk kackerlacka	1 droppe x 0,1 g	2 droppar x 0,1 g
Stor t.ex. orientalsk och amerikansk kackerlacka	2 droppar x 0,1 g	3 droppar x 0,1 g

Gelen ska lämnas kvar:

- i minst 14 dagar för små kackerlackor
- i minst 4 veckor för orientalsk kackerlacka
- i minst 12 veckor för amerikansk kackerlacka för att uppnå optimal effekt. Om kackerlackor fortfarande är synliga efter en månad så kan färsk gel appliceras.

**Mot silverfisk:**

Dos: 0,1g - 0,2g per m²

Applicera flera små droppar i områden där silverfiskarna bor och gömmer sig, ex. under trösklar, lister, paneler etc.:

- 20 små droppar (ca 3 mm) eller
- 65 små droppar (ca 2 mm)

Gelen ska lämnas kvar i minst 8 veckor för att uppnå optimal effekt. Om silverfiskar fortfarande är synliga därefter så kan färsk gel appliceras.

En effekt av bekämpningen kan förväntas väldigt snabbt och döda insekter kan ses inom 24 timmar efter påbörjad behandling.

Maximal effekt uppnås mellan 6 dagar och 2 månader efter påbörjad bekämpning beroende på storleken på angreppet så länge det finns gel kvar.

Vid stora angrepp inspektera appliceringspunkterna regelbundet (en gång i månaden) och applicera mer gel vid behov.

Applicera inte mer än en gång per månad.

**Bruksanvisning**

Maxforce® Platin doseras med lämplig gelapplikator.

Efter behandlingen ska den tomma patronen avlägsnas och kasseras på ett säkert sätt. Om patronen endast har använts delvis ska den tas bort från applikatorn, förseglas med det medföljande locket och därefter förvaras enligt anvisningarna.

Öppna inte eller försök att återfylla gelapplikator.

Före behandling ska området undersökas med lämplig metod för att identifiera var angrepp förekommer tex genom att använda fällor och/eller aerosoler för att jaga ut skadedjuren, leta efter spillning, ömsad hud, äggskal etc.

Alla andra födokällor för kackerlackor (avfall, matrester osv.) avlägsnas från det angripna området för att uppmuntra intag av gelen.

Produkten är speciellt användbar på områden där konventionella insekticider inte kan användas, såsom i närheten av elektriska eller elektroniska apparater.

På platser där man identifierat spridning av kackerlackor är det lämpligt att utöka appliceringen av produkten även till omkringliggande områden för att förbättra bekämpningen och undvika ytterligare spridning.

Undvik applicering på väldigt dammiga, fuktiga och smutsiga ytor.

Applicera inte produkten på ytor som våttorkas.

Applicera inte direkt på ytor där livsmedel eller djurfoder förvaras, hanteras eller förtärs.

Applicera enbart på platser som är oåtkomliga för barn och djur.

Applicera inte produkten i områden som nyligen behandlats med annan insekticid och undvik att kontaminera gelen med andra insekticider.

Undvik kontinuerlig användning av produkten.

Produkten ska inte användas i stallar, djurinhägnader eller burar.

Rekommenderas inte i byggnader där det finns insektsätande fåglar och reptiler.

Avlägsnande av gammal produkt/gel ska göras av professionell skadedjursbekämpare.

Undvik kontakt med huden.

Tvätta händer och exponerad hud innan du äter och efter användning.

LÄS ANVISNINGARNA NOGA INNAN ANVÄNDNING

INFORMERA REGISTRERINGSINNEHAVAREN OM EFFEKTEN UTEBLIR

APPLICERA INTE PÅ ABSORBERANDE YTOR

EXPONERA INTE BETET FÖR SOLLJUS ELLER VÄRME (T.E.X. ELEMENT)

SKYDDA FRÅN VATTEN

Information: En del känsliga material såsom textilier kan fläckas av produkten. Prova först på en liten undanskymd yta om osäkerhet finns.

